

PERGUNTAS FREQUENTES

---

# VACINAÇÃO

## Quais são as doenças que as vacinas protegem?

Cada imunizante é responsável pela prevenção e proteção de diferentes doenças, então cada vacina vai agir para determinada patologia ou um conjunto delas. Em muitos casos, somente a vacina é capaz de proteger contra a transmissão de alguma enfermidade, como por exemplo, a poliomielite e a HPV; e, em outros, a vacina serve para evitar complicações, mas não impede que o ser humano adquira a doença, como é o caso da covid-19 e influenza.

Mas, para funcionalidade completa, é necessário completar o esquema vacinal indicado. Por exemplo, alguns imunizantes exigem três doses daquela vacina, então é preciso tomar os três para ter eficácia e a proteção desejada.

Abaixo listamos as doenças que fazem parte do calendário de rotina de vacinação, algumas delas já foram até erradicadas do país com a adesão da vacinação.

São elas: formas graves da tuberculose (BCG); hepatite B; difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e infecções por haemophilus tipo B (pentavalente); poliomielite ou paralisia infantil (vacina inativada contra poliomielite - VIP); diarreias causadas por rotavírus (rotavírus - VORH); Infecções causadas por pneumococo (pneumo 10-valente); meningites causadas pelo meningococo C meningocócica C); febre amarela; sarampo, caxumba e rubéola (tríplice viral); hepatite A; sarampo, caxumba, rubéola e varicela (tetraviral); varicela ou catapora (varicela monovalente) e infecções pelo papiloma vírus humano - subtipos virais 6, 11, 16 e 18 (HPV).

## Como saber qual vacina tomar e qual o período correto?

A caderneta da criança e do adolescente é distribuída gratuitamente nas Unidades de Saúde da Família (USFs) no ato da primeira administração de vacina, que deve ser feita logo que o bebê nasce. Nela contém uma tabela com os imunizantes de rotina necessários e o período correto para aplicação.

Atenção: alguns imunizantes contém dose de reforço, na ato da vacina, a aplicadora já coloca a data que deve ser feita a outra dose, por isso é importante que os pais se atentem para isso para manter o calendário vacinal sempre atualizado.

Veja a tabela a seguir:

BCG	HEPATITE B	PENTAVALENTE			VIP - PÓLIO INATIVADA		
Dose única	Dose ao nascer	1ª dose	2ª dose	3ª dose	1ª dose	2ª dose	3ª dose
Ao nascer	Ao nascer	2 meses	4 meses	6 meses	2 meses	4 meses	6 meses
ROTAVÍRUS		PNEUMO 10		MENINGO C		F AMARELA	T VIRAL
1ª dose	2ª dose	1ª dose	2ª dose	1ª dose	2ª dose	Dose	1ª dose
2 meses	4 meses	2 meses	4 meses	3 meses	5 meses	9 meses	12 meses
PNEUMO 10	MENINGO C	DTP		VOP		TETRAVIRAL	VARICELA
Reforço	Reforço	1º Reforço	2º Reforço	1º Reforço	2º Reforço	Dose única	2ª dose
12 meses	12 meses	15 meses	4 anos	15 meses	4 anos	15 meses (Triplíce viral + varicela)	4 anos
HEPATITE A	HPV			INFLUENZA		F AMARELA	
Dose única	1ª dose	2ª dose	3ª dose	Dose anual		Reforço	
15 meses	9-14 anos	9-14 anos	Casos especiais (CRIE)	A partir de 6 meses		4 anos	

### Depois que completa a caderneta da criança e do adolescente, tem mais vacinas a serem tomadas?

Sim, além dos imunizantes de rotina que devem ser tomados na fase infantil, a prevenção continua em outros grupos como em gestantes, adultos e idosos. As gestantes, por exemplo, serão lembradas de tomar a vacina específica da gestação durante o pré-natal.

Na maioria dos casos, os adultos só precisam completar iniciar a imunização completa de vacinas que deveriam ter sido aplicadas ainda na infância ou adolescência.

Caso tenha qualquer dúvidas sobre imunização, procure a unidade mais próxima e fale com um de nossos aplicadores.

### Não tomei no período indicado, e agora?

Os imunizantes tem um período estimado para serem administrados, se você não tomou na data indicada pela aplicadora ou no ano pré-estabelecido, ainda existe um prazo para aplicação estabelecido pelo Plano Nacional de Imunização (PNI). Confira abaixo:

IMUNOBIOLÓGICO	Nº DOSES (ESQUEMA BÁSICO)	IDADE MÁXIMA PARA ADMINISTRAÇÃO
<b>BCG</b>	Dose única	4a 11m 29d
<b>Hepatite B</b>	Bebês: dose D (única) - esquema complementado na vacina pentavalente	30 dias
	3 doses (0- 30- 180 dias) Adolescentes e adultos: avaliar situação vacinal anterior	Qualquer faixa etária
<b>Pentavalente</b>	3 doses	4a 11m 29d
<b>VIP - Pólio inativada</b>	3 doses	4a 11m 29d
<b>Pneumo 10</b>	2 doses + reforço	4a 11m 29d
<b>Rotavírus</b>	2 doses	D1 - 3m e 15d D2 - 7m e 29d
<b>Meningo C</b>	2 doses + reforço	4a 11m 29d

<b>Febre Amarela</b>	Crianças: dose + reforço	9 meses até 59 anos
	Adultos: avaliar registro de vacinação anterior Dose única para pessoas a partir de 5 anos não vacinadas	
<b>Tríplice Viral</b>	2 doses (intervalo mínimo 30 dias)	1 a 29 anos e profissionais de saúde em qualquer idade
	1 dose	Pessoas de 30 a 59 anos
<b>Hepatite A</b>	Dose única	4 anos 11m 29d
<b>DTP - Tríplice Bacteriana</b>	2 reforços	6a 11m 29d
<b>VOP - Pólio Oral</b>	2 reforços	4a 11m 29d
<b>Varicela</b>	2 doses	6a 11m 29d
<b>HPV</b>	2 doses	9 a 14 anos para início do esquema de vacinação
<b>Meningite ACWY</b>	Dose única	11 e 12 anos
<b>dT Adulto</b>	3 doses + 1 reforço a cada 10 anos Avaliar situação vacinal anterior. Intervalo entre D1 e D2 - 60 dias Intervalo entre D2 e D3 - 60 dias	Pode ser utilizada a partir de 7 anos de idade
<b>dTp acelular adulto</b>	Gestantes: 1 dose em cada gestação (a partir de 20 semanas de idade gestacional)	Gestantes de qualquer idade
<b>Influenza</b>	Crianças 6m até 8a 11m - 2 doses na 1ª vez que recebe a vacina Dose única nos anos subsequentes	A partir de 6 meses de vida
	Crianças: a partir de 9 anos Adultos: dose única anual	

### A vacina da influenza deve ser tomada anualmente?

Sim, todos os anos a vacina é projetada com as cepas que estão em circulação no Brasil, isso é necessário porque os vírus respiratórios passam por mutações constantemente. A vacina deve ser tomada para todos a partir dos seis meses de vida.

Vale ressaltar que este ano é a primeira vez que o Ministério da Saúde (MS) autorizou iniciar a vacinação nos grupos prioritários no início do ano na região norte do país, em que as ondas sazonais de gripe têm maior incidência no primeiro semestre.

### E quanto às doses da covid-19? Quantas devo tomar?

Confira abaixo o esquema vacinal da covid-19 para todas as idades, os imunizantes disponíveis e a quantidade de reforço necessário.

#### Crianças na faixa etária de 6 meses até 4 anos

VACINA	ESQUEMA PRIMÁRIO	INTERVALO D1/D2	REFORÇO - REF	
			INTERVALO	VACINA
Pfizer Baby – a partir de 6 meses até 4 anos (cor: vinho)	3 doses D1 + D2 + D3	30 dias – D1 e D2 2 meses – D2 e D3	Não indicado	Somente Pfizer Baby
Coronavac (a partir de 3 anos)	2 doses D1 e D2	28 dias	4 meses após D2	Preferencialmente Pfizer Baby. Na indisponibilidade, utilizar Coronavac.

#### Crianças na faixa etária de 5 a 11 anos

VACINA	ESQUEMA PRIMÁRIO	INTERVALO D1/D2	REFORÇO - REF	
			INTERVALO	VACINA
Pfizer Pediátrica – a partir de 5 anos até 11 anos (cor: laranja)	2 doses D1 e D2	60 dias	4 meses após D2	Pfizer Pediátrica
Coronavac (a partir de 3 anos)	2 doses D1 e D2	28 dias	4 meses após D2	Pfizer Pediátrica

### Adolescentes de 12 a 17 anos

VACINA	ESQUEMA PRIMÁRIO	INTERVALO D1/D2	REFORÇO - REF	
			INTERVALO	VACINA
Pfizer Adulto Monovalente (cor: roxa)	2 doses D1 e D2	21 dias	4 meses após D2	Pfizer Bivalente (cor: cinza)
Coronavac	02 doses D1 e D2	21 dias	4 meses após D2	Pfizer Bivalente (cor: cinza)

### Indivíduos com idade acima de 18 anos

VACINA	ESQUEMA PRIMÁRIO (Mínimo 2 doses iniciais)	INTERVALO D1/D2	REFORÇO – VACINA BIVALENTE	
			INTERVALO	VACINA
Coronavac	2 doses D1 e D2	21 dias	4 meses após última dose	Pfizer Bivalente (cor: cinza)
<del>Astrazeneca</del>		60 dias		
Pfizer Monovalente (cor: roxa)		21 dias		
Janssen		60 dias		

## CALENDÁRIO BÁSICO DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA

IDADE	VACINAS	DOSE	DOENÇAS EVITADAS
<b>Ao nascer</b>	BCG ID	Dose única	Formas graves da tuberculose
	Hepatite B	Dose D	Hepatite B
<b>02 meses</b>	Pentavalente (DTP+HIB+Hepatite B)	1ª dose	Difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e infecções por haemophilus tipo B
	VIP (vacina inativada contra poliomielite)	1ª dose	Poliomielite ou paralisia infantil
	VORH (rotavírus)	1ª dose	Diarreias causadas por rotavírus
	Pneumo 10-valente	1ª dose	Infecções causadas por pneumococo
<b>03 meses</b>	Meningocócica C	1ª dose	Meningites causadas pelo meningococo C
<b>04 meses</b>	Pentavalente (DTP+HIB+Hepatite B)	2ª dose	Difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e infecções por haemophilus tipo B
	VIP (vacina inativada contra poliomielite)	2ª dose	Poliomielite ou paralisia infantil
	VORH (rotavírus)	2ª dose	Diarreias causadas por rotavírus
	Pneumo 10-valente	2ª dose	Infecções causadas por pneumococo
<b>05 meses</b>	Meningocócica C	2ª dose	Meningites causadas pelo meningococo C

<b>06 meses</b>	Pentavalente (DTP+HIB+Hepatite B)	3ª dose	Difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e infecções por haemophilus tipo B
	VIP (vacina inativada contra poliomielite)	3ª dose	Poliomielite ou paralisia infantil
<b>09 meses</b>	Febre amarela	Dose única	Febre amarela
<b>12 meses</b>	SCR (Tríplice viral)	Dose única	Sarampo, caxumba e rubéola
	Pneumo 10-valente	Reforço	Infecções causadas por pneumococo
	Meningocócica C	Reforço	Meningites causadas pelo meningococo C
<b>15 meses</b>	DTP (tríplice bacteriana)	1ª reforço	Difteria, tétano e coqueluche
	VOP (vacina oral contra poliomielite)	1ª reforço	Poliomielite ou paralisia infantil
	Hepatite A	Dose única	Hepatite A
	Tetraviral	Dose única	Sarampo, caxumba, rubéola e varicela
<b>4 anos</b>	VOP (vacina oral contra poliomielite)	2ª reforço	Poliomielite ou paralisia infantil
	DTP (tríplice bacteriana)	2ª reforço	Difteria, tétano e coqueluche
	Febre amarela	Reforço	Febre amarela
	Varicela Monovalente	2ª dose	Varicela (catapora)

**CALENDÁRIO BÁSICO DE VACINAÇÃO DO ADOLESCENTE**

<b>VACINAS</b>	<b>DOSES</b>	<b>DOENÇAS EVITADAS</b>
HPV	02 doses Meninas e meninos – 09 a 14 anos	Infecções pelo papiloma vírus humano (subtipos virais 6, 11, 16 e 18)
Hepatite B	3 doses ( caso não tenha registro anterior ) Avaliar situação vacinal anterior	Hepatite B
Dt adulto	3 doses + 01 reforço a cada 10 anos Avaliar situação vacinal anterior	Contra difteria e tétano
Febre amarela	Dose única ( a partir de 05 anos de idade) Avaliar situação vacinal anterior	Febre amarela
Triplice viral - SCR (até 29 anos)	02 doses (intervalo de 30 dias) Avaliar situação vacinal anterior	Sarampo, caxumba e rubéola
Meningo ACWY	Adolescentes (meninos e meninas) 11 a 12 anos	Formas de Meningite

**CALENDÁRIO BÁSICO DE VACINAÇÃO DA GESTANTE**

<b>VACINAS</b>	<b>DOSES</b>	<b>DOENÇAS EVITADAS</b>
Hepatite B (qualquer faixa etária)	3 doses Avaliar situação vacinal anterior	Hepatite B
Dt adulto	3 doses + 01 reforço a cada 10 anos Avaliar situação vacinal anterior	Contra difteria e tétano
Influenza	01 dose anual por campanha	Vírus influenza
Dtpa (tríplice bacteriana acelular)	Dose única – para gestante a partir da 20ª semana de idade gestacional (05 meses) ou puérperas até 45 dias pós-parto.	Difteria, tétano e coqueluche

**CALENDÁRIO BÁSICO DE VACINAÇÃO DO ADULTO E IDOSO**

<b>VACINAS</b>	<b>DOSES</b>	<b>DOENÇAS EVITADAS</b>
Hepatite B (qualquer faixa etária)	3 doses Avaliar situação vacinal anterior	Hepatite B
Dt adulto	3 doses + 01 reforço a cada 10 anos Avaliar situação vacinal anterior	Contra difteria e tétano
Febre amarela	Dose única Avaliar situação vacinal anterior	Febre amarela
Triplíce viral- SCR	02 doses (até 29 anos) 01 dose - 30 a 59 anos Avaliar situação vacinal anterior	Sarampo, caxumba e rubéola
Influenza (a partir de 60 anos e grupos de risco)	01 dose anual	Vírus influenza
Dtpa (tríplice bacteriana acelular)	Dose única – para gestante a partir da 20ª semana de idade gestacional (05 meses) ou puérperas até 45 dias pós-parto.	Difteria, tétano e coqueluche

**CALENDÁRIO BÁSICO DE VACINAÇÃO DO ADULTO E IDOSO**

<b>VACINAS</b>	<b>DOSES</b>	<b>DOENÇAS EVITADAS</b>
Hepatite B (qualquer faixa etária)	3 doses Avaliar situação vacinal anterior	Hepatite B
Dt adulto	3 doses + 01 reforço a cada 10 anos Avaliar situação vacinal anterior	Contra difteria e tétano
Febre amarela	Dose única Avaliar situação vacinal anterior	Febre amarela
Triplice viral- SCR	02 doses (até 29 anos) 01 dose - 30 a 59 anos Avaliar situação vacinal anterior	Sarampo, caxumba e rubéola
Influenza (a partir de 60 anos e grupos de risco)	01 dose anual	Vírus influenza
Dtpa (tríplice bacteriana acelular)	Dose única – para gestante a partir da 20ª semana de idade gestacional (05 meses) ou puérperas até 45 dias pós-parto.	Difteria, tétano e coqueluche

**IDADE MÁXIMA PARA ADMINISTRAÇÃO DOS IMUNOBIOLÓGICOS DE ACORDO COM O PNI**

<b>IMUNOBIOLÓGICO</b>	<b>Nº DOSES (ESQUEMA BÁSICO)</b>	<b>IDADE PARA ADMINISTRAÇÃO</b>
<b>BCG</b>	Dose única	04a 11m 29d
<b>Hepatite B</b>	Bebês - Dose D (única) - esquema complementado na vacina pentavalente	30 dias
	03 doses (0- 30- 180 dias) Adolescentes e adultos - avaliar situação vacinal anterior.	Qualquer faixa etária
<b>Pentavalente</b>	03 doses	04a 11m 29d
<b>VIP - Pólio inativada</b>	03 doses	04a 11m 29d
<b>Pneumo 10</b>	02 doses + REF	04a 11m 29d
<b>Rotavírus</b>	02 doses	D1 - 03m e 15d D2 - 07m e 29d
<b>Meningo C</b>	02 doses + REF	04a 11m 29d
<b>Febre Amarela</b>	Crianças - Dose + REF	09 meses até 59 anos
	Adultos - Avaliar registro de vacinação anterior Dose única para pessoas a partir de 05 anos não vacinadas	
<b>Tríplice Viral</b>	02 doses (intervalo mínimo 30 dias)	01 a 29 anos e profissionais de saúde em qualquer idade
	01 dose	Pessoas de 30 a 59 anos
<b>Hepatite A</b>	Dose única	04 anos 11m 29d
<b>DTP - Tríplice Bacteriana</b>	02 Reforços	06a 11m 29d

<b>VOP - Pólio Oral</b>	02 Reforços	04a 11m 29d
<b>Varicela</b>	02 doses	06a 11m 29d
<b>HPV</b>	02 doses	09 a 14 anos para início do esquema de vacinação
<b>Meningite ACWY</b>	Dose única	11 e 12 anos
<b>dT Adulto</b>	03 doses + 01 reforço a cada 10 anos Avaliar situação vacinal anterior. Intervalo entre D1 e D2 - 60 dias Intervalo entre D2 e D3 - 60 dias	Pode ser utilizada a partir de 07 anos de idade
<b>dTp acelular adulto</b>	Gestantes 01 dose em cada gestação (a partir de 20 semanas de idade gestacional)	Gestantes de qualquer idade
<b>Influenza</b>	Crianças 06m até 08a 11m - 02 doses na 1ª vez que recebe a vacina. Dose única nos anos subsequentes	A partir de 06 meses de vida.
	Crianças a partir de 09 anos e adultos Dose única anual	

**SALAS DE VACINAS POR UNIDADE DE SAÚDE REGIÃO NORTE**

<b>UNIDADE DE SAÚDE</b>	<b>HORARIO DE FUNCIONAMENTO</b>	<b>VACINAS QUE APLICAM</b>
USF José Luiz Otaviani (Arno 33 - 307 Norte)	Fechada	Sala fechada
USF Arno 41 (403 Norte)	7h30 às 13h	Todas as vacinas do calendário básico, com exceção da BCG
USF Arno 42 (405 Norte)	7h30 às 13h	Todas as vacinas do calendário básico, aplica BCG
USF 406 Norte (Arne 53)	7h30 às 13h	Todas as vacinas do calendário básico, com exceção da BCG
USF Arno 44 (409 Norte)	7h30 às 17h30	Todas as vacinas do calendário básico, com exceção da BCG
USF Arno 61 (503 Norte)	7h30 às 18h30	Todas as vacinas do calendário básico, com exceção da BCG
USF Arne 64 (508 Norte)	7h30 às 18h30	Todas as vacinas do calendário básico, com exceção da BCG
USF Arno 71 (603 Norte)	7h30 às 18h	Todas as vacinas do calendário básico, com exceção da BCG

**SALAS DE VACINAS POR UNIDADE DE SAÚDE REGIÃO CENTRAL**

<b>UNIDADE DE SAÚDE</b>	<b>HORARIO DE FUNCIONAMENTO</b>	<b>VACINAS QUE APLICAM</b>
USF Deise de Fátima Araújo de Paula - Arse 13 (108 Sul)	7h30 às 17h30	Todas as vacinas do calendário básico, aplica BCG
USF Isabel Auler - Arso 23 (207 Sul)	7h30 às 18h30	Todas as vacinas do calendário básico, com exceção da BCG
USF Loiane Moreno Vieira - Arse 24 (210 Sul)	7h30 às 18h30	Todas as vacinas do calendário básico, com exceção da BCG
USF Francisco Júnior - Arso 41 (403 Sul)	7h30 às 17h	Todas as vacinas do calendário básico, aplica BCG
USF ASR SE 75 (712 Sul)	7h30 às 18h30	Todas as vacinas do calendário básico, com exceção da BCG
USF Arse 82 (806 Sul)	7h30 às 18h30	Todas as vacinas do calendário básico, aplica BCG
USF Albertino Santos - Arse 101 (1.004 Sul)	7h30 às 18h30	Todas as vacinas do calendário básico, com exceção da BCG
USF Satilo Alves de Sousa - Arso 111 (1.103 Sul)	7h30 às 18h30	Todas as vacinas do calendário básico, com exceção da BCG
USF Valéria Martins Pereira - Arse 122 (1.206 Sul)	7h30 às 18h	Todas as vacinas do calendário básico, com exceção da BCG
USF Heder de Oliveira Silva - Arse 131 (1304 Sul)	7h30 às 13h	Todas as vacinas do calendário básico, com exceção da BCG

**SALAS DE VACINAS POR UNIDADE DE SAÚDE REGIÃO SUL**

<b>UNIDADE DE SAÚDE</b>	<b>HORARIO DE FUNCIONAMENTO</b>	<b>VACINAS QUE APLICAM</b>
USF Laurides Lima Milhomem (Jardim Aurenny III)	7h30 às 18h30	Todas as vacinas do calendário básico, com exceção BCG
USF Liberdade (Jardim Aurenny III)	7h30 às 18h30	Todas as vacinas do calendário básico, com exceção da BCG
USF Eugênio Pinheiro Da Silva (Aurenny I)	7h30 às 18h30	Todas as vacinas do calendário básico, aplica BCG
USF Alto Bonito	7h30 às 18h30	Todas as vacinas do calendário básico, com exceção BCG

**SALAS DE VACINAS POR UNIDADE DE SAÚDE REGIÃO SUL**

<b>UNIDADE DE SAÚDE</b>	<b>HORARIO DE FUNCIONAMENTO</b>	<b>VACINAS QUE APLICAM</b>
USF Laurides Lima Milhomem (Jardim Aurenny III)	7h30 às 18h30	Todas as vacinas do calendário básico, com exceção BCG
USF Liberdade (Jardim Aurenny III)	7h30 às 18h30	Todas as vacinas do calendário básico, com exceção da BCG
USF Eugênio Pinheiro Da Silva (Aurenny I)	7h30 às 18h30	Todas as vacinas do calendário básico, aplica BCG
USF Alto Bonito (Jardim Aurenny IV)	7h30 às 18h30	Todas as vacinas do calendário básico, com exceção BCG
USF Novo Horizonte (Jardim Aurenny IV)	7h30 às 18h30	Todas as vacinas do calendário básico, com exceção da BCG
USF Jardim Aurenny II	Fechada	Sala Fechada
USF Santa Fé	7h30 às 18h30	Todas as vacinas do calendário básico, com exceção da BCG
USF Morada do Sol	8h às 12h e 13h às 17h	Todas as vacinas do calendário básico, com exceção da BCG
USF José Hermes Rodrigues Damaso (Setor Sul)	7h30 às 18h	Todas as vacinas do calendário básico, com exceção da BCG
USF Bela Vista	Fechada	Sala Fechada
USF Santa Bárbara	7h30 às 13h	Todas as vacinas do calendário básico, com exceção da BCG
USF José Lúcio de Carvalho (Lago Sul)	13h30 às 17h	Todas as vacinas do calendário básico, com exceção da BCG
USF Jardim Taquari	7h30 às 13h	Todas as vacinas do calendário básico, com exceção da BCG

**SALAS DE VACINAS POR UNIDADE DE SAÚDE DISTRITOS**

<b>UNIDADE DE SAÚDE</b>	<b>HORARIO DE FUNCIONAMENTO</b>	<b>VACINAS QUE APLICAM</b>
USF Mariazinha Rodrigues da Silva (Buritirana)	7h30 às 18h	Todas as vacinas do calendário básico, com exceção da BCG
USF Walter Pereira Morato (Taquaruçu)	7h30 às 17h	Todas as vacinas do calendário básico, com exceção da BCG
USF Walterly Wagner José R. de Sousa (Taquaruçu Grande)	8h às 17h (somente às quintas-feiras)	Todas as vacinas do calendário básico, com exceção da BCG